

新鋭工業
超音波式ネブライザー
コンフォートオアシス KU-200

【在宅】 ネブライザー療法

* 簡易的な説明のため
詳細は取扱説明書と
ともにご利用ください。

①吸入前準備



本体に水道水を入れます

水道水は作用槽の
水位線(約200ml)まで入れます

水道水は毎回新しいものを
入れ替え使用してください


②薬液の準備



カップホルダーを取り付け
薬液を入れます

薬液
生理食塩液20mlと
各ネブライザー用薬液

③送気ホースを取り付ける




霧化室と本体を送気ホースでつなげる

ホースのたわみに気を付けてください（詳細は取扱説明書）

* 霧化室には必ず空気孔を数カ所準備ください

④噴霧開始



吸入時間(Timer) 約15分
霧化量(Volume) Max
に調節し噴霧を開始

直接噴霧する場合
霧化量をMin～中に調節して
下さい。


⑤お手入れ

耐熱送気ホース、霧化室、薬液カップ、カップホルダーは毎回使用後に消毒乾燥してください

- ① 水洗い：水道水でよく洗い流します
- ② 消毒：次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン)に1時間以上漬ける
*ミルトンのホームページをご参照ください
- ③ 乾燥：自然乾燥または食器乾燥機を利用

薬液が付着したまま放置するとカビや雑菌が繁殖ますのでご注意下さい

⑤お手入れ



作用槽内の水道水は廃棄し
キッチンペーパーなどでよく
水分を取ってください

定期的な洗浄消毒は
取扱説明書をご参照ください